

| 経過 | 入院日 (手術前日) (/) | 手術当日 | | 術後1日目 (/) | 術後2日目 (/) | 退院日 (術後3日目) (/) |
|------|---|--|--|---|--|-------------------------|
| | | 手術前 | 手術後 | | | |
| 達成目標 | 1. 不安なく治療を受けることができる | | 2. 合併症なく過ごすことができる | | | |
| 治療処置 | | | <ul style="list-style-type: none"> ●カテーテル穿刺部止血のため手首を圧迫します。2~3時間後に低圧まで減圧し、翌朝まで低圧のまま圧迫を継続します ●心電図モニターを装着します ●帰宅より下記時間に状態観察を行います (帰宅時・1時間後・2時間後・3時間後・5時間後) | <ul style="list-style-type: none"> ●朝の検温時に手首の圧迫を除去します | <ul style="list-style-type: none"> ●心電図モニター終了です  | |
| 点滴 | | ●カテーテル室で点滴を開始します | <ul style="list-style-type: none"> ●血管拡張薬を点滴します ●抗生剤を点滴します  | ●点滴は終了です | | |
| 内服薬 | <ul style="list-style-type: none"> ●カテーテル手術を行うことが決まった時点で抗血小板薬を開始します ●手術2日前からビグアナイド系糖尿病薬を中止します | ●感染予防のために抗生剤を内服します | | | | ●ビグアナイド系糖尿病薬を再開します |
| 検査 | <ul style="list-style-type: none"> ●採血 ●胸部レントゲン ●心電図 ●橈骨動脈エコー  | | ●心電図 | <ul style="list-style-type: none"> ●採血 ●胸部レントゲン ●心電図 ●心筋シンチ | <ul style="list-style-type: none"> ●橈骨動脈エコー ●長時間心電図検査 ●上肢下肢動脈圧測定検査 | |
| 食事 | ●飲食可能です | ●手術前は軽めのお食事をお出しします | <ul style="list-style-type: none"> ●帰宅時より飲水可能です ●帰宅2時間後より食事可能です  | ●飲食可能です | | |
| 活動 | ●院内歩行可能です | ●手術前に手術着に着替えます | <ul style="list-style-type: none"> ●リクライニング車椅子で帰宅します ●帰宅1時間は床上安静です ●帰宅1時間後よりトイレ歩行可能です | ●心臓リハビリを行います | | |
| 清潔 | ●入浴可能です | | | ●清拭を行います | ●入浴可能です | |
| 説明 | ●術前オリエンテーションを行います | | | ●心臓病教室を行います | ●心臓病教室を行います | ●退院前に主治医から病状説明を行います |
| 備考 | <ul style="list-style-type: none"> ●手術同意書を確認します。担当看護師まで渡してください ●院内での貴重品管理は自己責任になります | <ul style="list-style-type: none"> ●2名まで手術見学ができます ●車で来られた家族の方は、車1台分のみ駐車割引券をお渡しします。担当看護師にお声がけください | ●手術後止血を行っている手首には力を入れないでください | | | |

入院期間については現時点で予想されるものです。

担当看護師 :

患者・家族 :