

不安定狭心症で
カテーテル治療を受けられる

様へ

(ID: _____)

担当医: _____

経過	手術当日		手術後1日目	術後2日目	手術後3日目	手術後4日目	手術後5日目	退院日 (手術後6日目)
	手術前	手術後						
月/日	(/)		(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)
達成目標	1. 合併症がなく経過する 2. 疾患について理解することが出来る 3. 抗血小板薬内服の必要性を理解することが出来る				4. 合併症がなく経過する 5. 日常生活について理解することができる			
治療処置	● 橈骨動脈もしくは大腿動脈からカテーテルを挿入して治療を行います。穿刺部は装具で翌日まで圧迫します ● 大腿アプローチの方はおしこの管を入れます		● 圧迫装具を外します ● 大腿アプローチの方はおしこの管を抜きます				● 心電図モニターを中止します	
点滴	● 点滴を開始			● 点滴を中止				
内服薬	● 抗血小板薬内服開始	● 抗コレステロール薬内服開始						
検査	● 採血 ● レントゲン ● 術前心電図	● 術後心電図	● レントゲン ● 心電図 		● 採血 ● 心電図 ● 動脈硬化検査 ● 腹部動脈エコー ● 心筋シンチ) 術後3~5日のいずれかで実施 		
食事		● 医師の許可後に食事を開始します 大腿アプローチの方はおにぎりを準備しています						
活動	● 橈骨アプローチの方は術1時間後からトイレ歩行可能です。大腿アプローチの方は圧迫装具が外れる翌日までベット上臥床です		● 橈骨アプローチの方は院内歩行可能です 大腿アプローチの方はトイレ歩行可能です		● 大腿アプローチの方は院内歩行可能です			
清潔			● 看護師が体拭きをお手伝いします	● シャワー浴可能です	● CCU退出後は入浴可能です			
説明		● 医師から病状説明があります ● 病棟オリエンテーションを行います	● 離床可能となってから心臓病教室に参加してもらいます ● 栄養士から食事指導があります。同居されているご家族も参加してください ● 薬剤師から薬剤指導があります					● 退院前に主治医からお話があります
備考								

入院期間については現時点で予想されるものです。

担当看護師: _____

患者・家族: _____